

HANDLED

Inspektion

Hypotrofier

Svullnad, rodnad, hämatom

Felställningar (färska fraktur, felställning efter tidigare skada)

Rörlighet (med armbågen fixerad i 90°)

Flexion/extension

Pronation/supination

Ulnar och radial deviation

(Notera inskränkning, rörelsesmärta och ändlägessmärta)

Palpation

Proc. styloideus radii

Distala radius

Caput ulnae

1:a dorsala senfacket

DRU-leden (distala leden mellan radius o ulna)

Fossa Tabatière

Os pisiforme

Specifika stest

Test av instabil DRU-led



Finkelsteins test (Mb Quervain)

Distalstatus

A radialis, (a ulnaris)

Motorik N radialis, medianus, ulnaris

Sensorik N radialis, medianus, ulnaris



fossa tabatière är den ytanatomiska inbuktning som syns mellan de långa senorna till tummen då du håller tummen utsträckt från pekfingret. Det är på fossans botten man palperar os scaphoideum.



Finkelstein's test is used to diagnose DeQuervain's tenosynovitis in people who have wrist pain. To perform the test, the examining physician grasps the thumb and the hand is ulnar deviated sharply. If sharp pain occurs along the distal radius (top of forearm, close to wrist; see image), DeQuervain's tenosynovitis is likely.